

TEST Owulacyjny LH strumieniowy ultraczuły 1 sztuka DIATHER



Cena: 25,69 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	5 szt.
Postać	-
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis TEST Owulacyjny LH strumieniowy ultraczuły 1 sztuka DIATHER TEST OWULACYJNY ULTRACZUŁY (5 testów) domowy, strumieniowy, ultraczuły test służący do wykrywania hormonu LH w moczu, test do oznaczania dni płodnych. **ZASTOSOWANIE** Szybki test przeznaczony do wykrywania ludzkiego hormonu LH o stężeniu równym lub wyższym 30 mIU/ml. Test wykorzystuje zjawisko nagłego wzrostu poziomu hormonu LH w moczu kobiety. Wykonanie badania jest proste: polega na zanurzeniu testu w pojemniku z moczem lub umieszczeniu bezpośrednio pod strumieniem moczu na 15 sekund i odczytaniu w ciągu 3 minut wyniku badania. **CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU** TEST OWULACYJNY ULTRACZUŁY przeznaczony jest do określania stężenia hormonu luteinizującego (LH) w moczu. Poziom hormonu wzrasta tuż przed najbardziej płodnym dniem w cyklu miesięczkowym. Wzrost hormonu LH powoduje uwolnienie jednej z komórek jajowych z jajnika, co określa się mianem owulacji. **WSKAZANIA DO WYKONANIA TESTU** Oznaczenie dni płodnych. **STRESZCZENIE** Podczas owulacji (jajeczkowania) dochodzi do uwolnienia z jajnika dojrzałej, gotowej do zapłodnienia komórki jajowej, która dostaje się do jajowodu, gdzie może zostać zapłodniona, jeśli w ciągu 24 godzin dojdzie do spotkania z nasieniem mężczyzny. W połowie cyklu miesięczkowego w organizmie kobiety dochodzi do nagłego wzrostu stężenia hormonu luteinizującego (tzw. „pik LH”). Owulacja następuje zwykle w ciągu 24 do 36 godzin po „piku LH” i właśnie w tym czasie jest najbardziej prawdopodobne zajście w ciążę. Należy mieć świadomość, że owulacja może nie wystąpić w każdym cyklu. TEST OWULACYJNY ULTRACZUŁY jest szybkim testem strumieniowym, służącym do wykrywania ludzkiego hormonu LH o stężeniu równym lub wyższym niż 30 mIU/ml. Test wykorzystuje zjawisko nagłego wzrostu poziomu hormonu LH w moczu kobiety. Wykonanie badania jest proste: polega na zanurzeniu testu w pojemniku z moczem lub umieszczeniu bezpośrednio pod strumieniem moczu na 15 sekund. i odczytaniu w ciągu 3 minut wyniku badania. **OPAKOWANIE ZAWIERA** 5 szaszetek z testem strumieniowym instrukcja użycia