Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

TEST COVID-19 VivaDiag Pro SARS CoV-2 AG Rapid test 1 sztuka

Cena: 17,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	CENTRUM DIABETOLOGII SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisTEST VivaDiag Pro SARS CoV-2 AG Rapid test 1 sztuka VivaDiag Pro Sars-Cov-2 Ag Rapid Test jest szybkim testem służącym do jakościowego wykrywania antygenu białkowego nukleokapsydu z SARS-CoV-2 w wymazie z nosa, wymazie z jamy ustnej i gardła lub wymazie z jamy nosowo-gardłowej.Właściwości:Rapid Test VivaDiag Pro bazuje na metodzie immunologicznej. Na płytce testowej znajduje się jedna linia testowa zawierająca unieruchomione przeciwciała monoklonalne przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 (linia T) oraz jedna linia kontroli jakości (linia C) zawierająca unieruchomione anty-mysie przeciwciała poliklonalne IgG. Wyekstrahowaną próbkę nanosi się do okienka nanoszenia na płytce testowej, gdzie reaguje ona z wyznakowanym przeciwciałem, tworząc kompleks antygen-przeciwciało. Następnie roztwór migruje wzdłuż membrany siłami kapilarnymi i wchodzi w interakcję z przeciwciałami monoklonalnymi przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 znajdującymi się na linii testowej. Jeśli próbka zawiera antygen wirusa SARS-CoV-2, linia testowa zmieni kolor na purpurowo-czerwony, wskazując na dodatni wynik wobec antygenu SARS-CoV-2. W przeciwnym razie wynik testu będzie ujemny.Specyfikacja techniczna:Czułość = 95,04 % ; Swoistość = 100 %Czas pomiaru - do 15 min.Rodzaj próbki - wymaz z nosa (zalecany) lub gardła lub jamy nosowo-gardłowej.Rodzaj antygenu - białko nukleokapsydu wirusa SARS-CoV-2.Temperatura pracy - 15-30 Temperatura przechowywania - 2-30 Okres przechowywania (nieotwarte) - 24 miesiące**Sposób użycia**Przelać cały roztwór ekstrakcyjny do próbówki ekstrakcyjnej.Pobrać próbkę z nosa, z jamy ustnej i gardła lub z jamy nosowo-gardłowej.Włożyć wymazówkę z pobraną od pacjenta próbką do probówki ekstrakcyjnej napełnionej roztworem ekstrakcyjnym.Nałożyć zakraplacz na probówkę ekstrakcyjną.Wyjąć płytkę testową z opakowania foliowego i położyć na czystej, równej powierzchni.Nanieść 3 krople wyekstrahowanej próbki do okienka nanoszenia próbki na płytce testowej.Odczytać wynik po 15 minutach. Nie odczytywać wyniku po czasie dłuższym niż 20 minut.