

THERAFLU ZATOKI 14 saszetek



Cena: 28,06 PLN

Opis słownikowy

Producent NOVARTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

Wskazania THERAFLU ZATOKI 14 saszetek • Łagodzi objawy związane z chorobami zatok, przeziębieniem i grypą. • Udrożnia nos i zatoki. • Zmniejsza ból głowy i zatok. • Ułatwia oddychanie. • Zawiera paracetamol o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. • Łagodzi objawy związane z chorobami zatok, przeziębieniem i grypą. • Udrożnia nos i zatoki. • Zmniejsza ból głowy i zatok. • Ułatwia oddychanie. • Zawiera paracetamol o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. **Działanie** Zatkane zatoki nie tylko utrudniają oddychanie, ale często towarzyszy im także silny, utrudniający normalne funkcjonowanie ból. Theraflu Zatok to wieloskładnikowy lek stworzony po to, aby zmniejszać dolegliwości związane z chorobami zatok oraz pomagać podczas pierwszych objawów przeziębienia i grypy. Jego formuła zawiera paracetamol o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym oraz substancję czynną na katar, która zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok. Dzięki temu udrożnia nos i zatoki, a także redukuje gorączkę, dreszcze oraz bóle głowy i mięśni. Theraflu Zatok doskonale rozpuszcza się w gorącej wodzie, tworząc roztwór doustny o rozgrzewających właściwościach. Przekonaj się, że to doskonały wybór, gdy chcesz jak najszybciej pozbyć się bólu zatok, kataru i pierwszych objawów przeziębienia! **Sposób użycia** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Lek do stosowania doustnego w postaci roztworu. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 saszетка co 4-6 godzin, nie więcej niż 3-4 saszetki. Sposób przygotowania: zawartość jednej saszetki rozpuścić w 1 szklance gorącej (nie wrzącej) wody. Wypić po wystygnięciu. Dawkowanie w przypadku pacjentów z chorobami wątroby i niewydolnością nerek zostały opisane w ulotce informacyjnej dla pacjenta. **Ważne** Kiedy nie stosować leku Theraflu Zatok: nadwrażliwości (alergii) na paracetamol, chlorowodorek fenylefryny lub inne składniki tego leku wymienione w punkcie 6, jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 14 dni inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory IMAO, leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona); jeśli pacjent nie wie, czy leki stosowane przez niego z przepisu lekarza zawierają inhibitory IMAO, powinien zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed przyjęciem leku opisanego w ulotce, jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub bardzo wysokie ciśnienie tętnicze (nadciśnienie), jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy, jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania (choroba oczu z postępującym uszkodzeniem nerwu wzrokowego i co najmniej częściowo związanej z podwyższonym ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej), jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy (guz zlokalizowany w pobliżu nerek, który powoduje zwiększenie ciśnienia tętniczego), jeśli pacjent przyjmuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, jeśli pacjent przyjmuje leki beta-adrenolityczne (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i chorób serca), jeśli pacjent przyjmuje doustnie inne leki sympatykomimetyczne, takie jak donosowe leki obkurczające błonę śluzową nosa, leki hamujące apetyt itp. ciąży i karmienia piersią, u dzieci poniżej 12 lat. **Skład** Substancjami czynnymi są: paracetamol (*Paracetamolum*), fenylefryna (*Phenylephrini hydrochloridum*). 1 saszетка zawiera 650 mg

paracetamolu i 10 mg chlorowodoru fenylefryny. Substancje pomocnicze: sacharozę, acesulfam potasowy, żółcień chinolinową E104, żółcień pomarańczową, maltodekstrynę M100, krzemionkę koloidalną uwodnioną, naturalne aromaty cytrynowe, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian dwuwodny, wapnia fosforan. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania

Galeria

