

TROXERUTIN 20mg/g żel 30 g

Cena: 10,60 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,02 g/g
Opakowanie	30 g
Postać	żel
Producent	CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Troxeutinum

Opis produktu

Wskazania Lek jest wskazany do miejscowego stosowania na skórę w bólach i obrzękach nóg, wywołanych przewlekłą niewydolnością żylną oraz jej objawami takimi jak uczucie "ciężkich nóg" i bóle kończyn dolnych, obrzęki kończyn dolnych, żylaki podudzi. **Działanie** Troxeutyna należy do grupy bioflawonoidów. Zmniejsza przepuszczalność i łamliwość naczyń włosowatych. Hamuje działanie hialuronidazy w stanach zapalnych tkanek, dzięki czemu zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń i prowadzi do zmniejszenia wysięku i obrzęku tkanek. Ponadto zwiększa stopień napięcia mięśniówki naczyń, usprawniając w ten sposób przepływ krwi. Troxeutyna wchłania się przez skórę. **Sposób użycia** Troxeutinum - żel do stosowania zewnętrznego. Cienką warstwę żelu nakładać 2 razy na dobę na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry i delikatnie wmasowywać aż do całkowitego wchłonięcia. **Ważne** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. **Skład** 1 g żelu: substancja czynna: troxeutyna - 20 mg; substancje pomocnicze: Karbomer, polioksyetylenowany olej rycynowy, trójetanoloamina, gliceryna, wersenian dwusodowy, etanol 96%, woda oczyszczona.