

UroLact doustny Probiotyk Urologiczny 400mg, 10 kaps.

Cena: 19,49 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	10 kaps.
Producent	MIRALEX
Rodzaj rejestracji	Suplement diety

Opis produktu

Opis UroLact doustny Probiotyk Urologiczny 400mg

UroLact® doustny probiotyk urologiczny, który wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego. Bakterie probiotyczne z rodzaju *Lactobacillus* obecne w preparacie UroLact® stanowią część prawidłowej mikrobioty przewodu pokarmowego. Wykazują one również naturalną zdolność przemieszczania się wzdłuż przewodu pokarmowego do odbytnicy i odbytu, skąd migrują do cewki moczowej i ujścia pochwy u kobiet. Dzięki wysokiej zdolności do kolonizacji nabłonka dróg moczowych oraz wypierania obecnych tam mikroorganizmów chorobotwórczych, szczepy bakteryjne zawarte w preparacie UroLact® wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego.

Właściwości składników UroLact®:

UroLact® zawiera kompozycję trzech żywych szczepów bakterii probiotycznych – *Lactobacillus rhamnosus* PL1, *Lactobacillus plantarum* PM1 oraz *Lactobacillus reuteri* 5454

Bakterie te korzystnie wpływają na mikrobiotę układu moczowego dzięki zdolności hamowania wzrostu bakterii chorobotwórczych oraz grzybów drożdżopodobnych, będących najczęstszą przyczyną infekcji dróg moczowo-płciowych.

W badaniach *in vitro* potwierdzono szereg korzystnych właściwości szczepów bakterii z rodzaju *Lactobacillus* obecnych w preparacie UroLact®:

hamowanie wzrostu bakterii będących najczęstszą przyczyną nawrotowych zakażeń układu moczowego: *Escherichia coli* (czynnik etiologiczny 80–90% pierwszorazowych zakażeń układu moczowego), *Klebsiella pneumoniae*, *Enterococcus faecalis*, *Streptococcus agalactiae*, *Pseudomonas aeruginosa*, hamowanie wzrostu patogennych grzybów z rodzaju *Candida* powodujących kandydozę dróg moczowo-płciowych, oporność na kwas solny i sole żółci, co umożliwia przeżywanie pasażu (przemieszczania się) przez żołądek i jelito, silne przyleganie (adhezja) do komórek nabłonka jelita, odbytu, cewki moczowej i pochwy.

Zalecane spożycie

dzieci od 3. roku życia: 1 kapsułka 1 raz dziennie, dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie. UroLact® polecany jest przy nawracających infekcjach dróg moczowych.

Stosować doustnie.

Kapsułkę połknąć popijając 100 ml (pół szklanki) letniej wody.

W przypadku braku możliwości połknięcia, zawartość kapsułki można zmieszać z pokarmem lub chłodną wodą. UroLact® najlepiej spożywać w trakcie posiłku (zapewnia to wyższą przeżywalność bakterii zawartych w preparacie). Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i zrównoważonego sposobu odżywiania.

Czas stosowania:

Dla utrzymania właściwej równowagi mikroflory układu moczowego – UroLact® powinien być stosowany nie krócej niż 10 dni.

Składniki

substancja wypełniająca – maltodekstryna ziemniaczana; inulina z korzenia cykorii; kapsułka – hydroksypropylometyloceluloza; liofilizowane żywe kultury bakterii (Lactobacillus rhamnosus PL1, Lactobacillus plantarum PM1 oraz Lactobacillus reuteri 5454); substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu; kwas L-askorbinowy (witamina C).

	Zawartość składników w przeliczeniu na zalecaną porcję: w 100 g produktu	Zawartość składników w przeliczeniu na zalecaną porcję: w 1 kapsułce	Zawartość składników w przeliczeniu na zalecaną porcję: w 2 kapsułkach	% RWS** w kapsułce
Liofilizowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus PL1, Lactobacillus plantarum PM1 i Lactobacillus reuteri 5454	~500 mld CFU*	~2 mld CFU*	~4 mld CFU*	-
Tłuszcz	0 g	0 g	0 g	0,00%
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone)	0 g	0 g	0 g	0,00%
Błonnik	11,6 g	0,05 g	0,1 g	-
*CFU - jednostka tworząca kolonię (ang. colony-forming unit)				

**RWS - referencyjna dzienna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal)				

Nie zawiera tłuszczu.

Wysoka zawartość błonnika pokarmowego.

Galeria

