

Vernikabon płyn, 100ml



Cena: 28,39 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	100 ml
Producent	BONIMED
Rodzaj rejestracji	Suplement diety

Opis produktu

Opis Vernikabon - suplement diety **Zalecane spożycie**

2 razy dziennie po 2 łyżeczki preparatu przed jedzeniem. Przed użyciem wstrząsnąć.

Składniki

miód pszczeli*, woda, wyciąg z zieleń bylicy pospolitej (*Artemisia vulgaris* L.) pozbawiony tujonu, wyciąg z nasion czarnuszki (*Nigella sativa* L.), ekstrakt z owoców orzecha włoskiego (*Juglans regia* L.) pozbawiony juglonu, ekstrakt z liści papai (melonowiec właściwy *Carica papaya* L.), ekstrakt z owoców róży (*Rosa canina* L.), ekstrakt z kłącza imbiru (*Zingiber officinale* Rosc.), ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (*Piper nigrum* L.), olejki eteryczne: goździkowy (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L. M. Perry), kminkowy (*Carum carvi* L.), tymiankowy (*Thymus vulgaris* L.), kolendrowy (*Coriandrum sativum* L.), miętowy (*Mentha piperita* L.), cytrynowy (*Citrus limon* (L.) Burm. f.), substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoosan sodu.

*Miód nektarowy, wielokwiatowy

Zawartość składników w dziennej porcji - 4 łyżeczki (ok. 20 g):

Wyciąg z zieleń bylicy pospolitej 600 mg
Wyciąg z nasion czarnuszki 600 mg
Ekstrakt z owoców orzecha włoskiego 400 mg
Ekstrakt z liści papai 144 mg
Ekstrakt z owoców róży 120 mg
Ekstrakt z kłącza imbiru 20 mg
Ekstrakt z owoców pieprzu czarnego 1 mg
Olejek goździkowy 0,12 mg
Olejek kminkowy 0,11 mg
Olejek tymiankowy 0,11 mg
Olejek kolendrowy 0,10 mg
Olejek miętowy 0,10 mg
Olejek cytrynowy 0,10 mg

Masa netto: 100 ml

Ważne

Nie stosować u osób uczulonych na składniki preparatu, mentol lub rośliny z rodziny astrowatych – Asteraceae (dawniej złożonych – Compositae) i jasnotowatych – Lamiaceae (Labiatae). Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią. Ze względu na żółciopędne właściwości składników, produktu nie należy spożywać w przypadku niedrożności jelit lub dróg żółciowych oraz podczas ataku kolki żółciowej. Spożywanie preparatu u dzieci wieku 3-18 lat skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.