

VIAGRA CONNECT MAX 50 mg 2 tabletki



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cena: 32,69 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,05 g
Opakowanie	2 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	UPJOHN EESV
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Sildenafilum

Opis produktu

Opis

O Viagra Connect® Max Jak działa Viagra Connect® Max? Jak stosować? O erekcji

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Fantastycznie jest cieszyć się sprawnością seksualną i swobodnie z niej korzystać. Z lekiem Viagra Connect® Max możesz być w szczytowej formie!

Viagra Connect® Max teraz dostępna bez recepty. To zmienia wszystko! Przekonaj się, jak wraca radość z udanego seksu!1

To moc legendarnej, niebieskiej tabletki. Od niemal 25 lat ufa jej cały świat! Teraz nastąpiła rewolucja! Viagra Connect® Max dostępna jest **bez recepty!** Poczuj różnicę z Viagra Connect® Max i odkryj na nowo radość z seksu.1

Jak działa Viagra Connect® Max?

Viagra Connect® Max powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych w penisie, dzięki czemu może do niego dopływać więcej krwi. Oznacza to, że mężczyzna może osiągnąć erekcję, gdy jest podniecony seksualnie. Może też utrzymać erekcję do końca stosunku seksualnego. Po jego zakończeniu erekcja powinna ustąpić.1

Aż 74% mężczyzn potwierdziło, że Viagra Connect® Max znacznie poprawiła u nich erekcję.1

Postaw na szczytową formę!

Im więcej uwagi sobie poświęcisz, tym lepszy efekt będzie mieć Viagra Connect® Max!

Zadbaj o odpowiedni nastrój

Viagra Connect® Max zaczyna działać nawet już po 12 minutach od zastosowania2 tak, abyś był gotowy w odpowiednim momencie. Pamiętaj, że przyjeżdża cię Viagra Connect® Max nie spowoduje natychmiastowej erekcji – niezbędne jest podniecenie seksualne. Zaangażuj się z partnerką/partnerem w grę wstępna.

Zrelaksuj się

Nie spiesz się. Viagra Connect® Max działa do czterech godzin po przyjęciu. Lek zadziała w odpowiedzi na stymulację seksualną.

Odzyskaj pewność siebie

Viagra Connect Max to maksymalna poprawa jakości życia seksualnego, dzięki mocy legendarnej niebieskiej tabletki. Odkryj jak odzyskać pewność siebie i odbudować samoocenę. Lek pomoże Ci: - osiągnąć erekcję w celu odbycia stosunku seksualnego, - utrzymać erekcję na tyle silną, by odbyć stosunek seksualny, - utrzymać erekcję przez cały czas trwania stosunku seksualnego.

Nie poddawaj się

Jeżeli produkt Viagra Connect® Max nie zadziała za pierwszym razem, nie przejmuj się tym. Ponowne przyzwyczajenie się do erekcji może zająć trochę czasu. Następnym razem, gdy będziesz gotowy, weź kolejną tabletkę - ale nigdy więcej niż jedną na dobę.

Zawsze czytaj zalecenia

W ulotce dla pacjenta dołączonej do opakowania produktu znajdziesz dokładne informacje na temat tego, jak uzyskać najlepsze rezultaty stosując Viagra Connect® Max.

Jak stosować Viagra Connect® Max?

Stosując produkt Viagra Connect® Max zawsze należy postępować według zaleceń w ulotce dla pacjenta dołączonej do opakowania.

O erekcji

Erekcja, czyli męski wzwód polega na napływie krwi do prącia. Umożliwia to usztywnienie członka, co pozwala na odbycie pełnego stosunku seksualnego. Niektórym mężczyznom trudno jest osiągnąć albo utrzymać erekcję za każdym razem, gdy próbują odbyć stosunek seksualny. U niektórych zaś problemy z erekcją pojawiają się raz na jakiś czas. **Problemy ze wzwodem objawiają się w różny sposób. Może to być:**

zupełny brak erekcji 2

erekcja niewystarczająca do odbycia stosunku seksualnego 3

problem z utrzymaniem erekcji do końca stosunku 3

Szacuje się, że **około 2,6 miliona mężczyzn** w Polsce⁴ doświadcza problemów z erekcją, ale wielu z nich nie chce rozmawiać na ten temat i wypiera problem – czasem nawet latami.^{5, 6} Problemy z erekcją nie powinny być powodem do zakłopotania czy wstydu, a raczej powinny być bodźcem do poszukiwania porady u lekarza w celu weryfikacji stanu zdrowia, w szczególności układu krążenia. Dobra wiadomość jest taka, że na rynku dostępne są skuteczne metody leczenia problemów z zaburzeniami erekcji⁵

Co jeszcze możesz zrobić?

Ruch to zdrowie⁷

Stres jest silnie powiązany z problemami z erekcją⁸, dlatego warto go minimalizować. Osobom zestresowanym może pomóc aktywność fizyczna, ponieważ pomaga się zrelaksować.

Szczuplejszy, czyli zdrowszy i sprawniejszy⁹

Zmiana diety pomoże obniżyć: masę ciała, poziom cholesterolu i ciśnienie krwi. Poprawi też stan Twojego serca.¹⁰ Wspomniane czynniki mają znaczny wpływ na problemy z erekcją.

Unikaj substancji psychoaktywnych¹¹

Stosowanie tych substancji negatywnie wpływa na potencję oraz zakłóca zdolność organizmu do osiągnięcia i utrzymania erekcji.^{12, 13}

Rzuć palenie¹⁴

Zaleca się rzucenie palenia jako jedną z najistotniejszych zmian stylu życia, które mogą pomóc w przypadku problemów z erekcją.

*maksymalna dawka dostępna bez recepty

VIAC-2022-0159

VIAGRA CONNECT® MAX, 50 mg, tabletki powlekane SKŁAD: Każda tabletki powlekana zawiera cytrynian syldenafilu w ilości równoważnej 50 mg syldenafilu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletki o mocy 50 mg zawiera 1,7 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Produkt leczniczy VIAGRA CONNECT® MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do satysfakcjonującej aktywności seksualnej. Do skutecznego działania produktu leczniczego VIAGRA CONNECT® MAX konieczna jest stymulacja seksualna. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w charakterystyce produktu leczniczego. Zgodnie z poznanym już wcześniej wpływem syldenafilu na szlak metaboliczny zależny od tlenu azotu i cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP) wykazano, że syldenafil nasila działanie hipotensyjne azotanów i w związku z tym jego równoczesne podawanie z substancjami uwalniającymi tlenek azotu (np. azotynem amylu) lub azotanami w dowolnej postaci jest przeciwwskazane. Stosowanie produktu leczniczego VIAGRA CONNECT® MAX z rytonawirem (silnym inhibitorem cytochromu P450) jest przeciwwskazane. Stosowanie inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), w tym syldenafilu, z substancjami pobudzającymi cyklazę guanylanową, np. riociguatem, jest przeciwwskazane, gdyż może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Substancji używanych w leczeniu zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu, nie należy stosować u mężczyzn, u których podejmowanie aktywności seksualnej może nie być wskazane. Do grupy tej należą pacjenci z ciężkimi chorobami układu krążenia, np. niedawno przeżytym zawałem mięśnia sercowego lub udarem mózgu (w ciągu ostatnich 6 miesięcy), niestabilną dławicą piersiową lub ciężką niewydolnością serca. Syldenafilu nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, niedociśnieniem tętniczym (ciśnienie tętnicze poniżej 90/50 mm Hg) oraz stwierdzonymi dziedzicznymi chorobami zwyrodnieniowymi siatkówki, np. retinitis pigmentosa (gdyż u niektórych pacjentów z tą chorobą występują genetyczne zaburzenia fosfodiesteraz siatkówkowych). Powyższe zalecenia wynikają z faktu, że syldenafil nie został przebadany pod kątem bezpieczeństwa stosowania w wspomnianych podgrupach. Syldenafil jest przeciwwskazany u pacjentów, u których doszło do utraty wzroku w jednym oku z powodu niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION, ang. non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy) - bez względu na to, czy epizod ten miał związek z wcześniejszą ekspozycją na inhibitory PDE5. Produktu leczniczego VIAGRA CONNECT® MAX nie należy stosować u pacjentów z deformacjami anatomicznymi prącia (np. skrzywieniem prącia, zwłóknieniem ciał jamistych lub chorobą Peyroniego). Produkt leczniczy VIAGRA CONNECT® MAX nie jest wskazany do stosowania przez kobiety oraz mężczyzn bez zaburzeń erekcji, jak i mężczyzn w wieku poniżej 18 lat. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Holandia. Niniejsza informacja została przygotowana dnia 31.03.2022 na podstawie ChPL Viagra Connect® Max, zatwierdzonej dnia 19.11.2021. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: Pfizer Polska Sp. z o.o. tel. 22 335 61 00.

Referencje: 1. *Viagra Connect® Max - Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL)* zatwierdzona 19.11.2021 r. 2. *EAU Erectile dysfunction- Patient Information* [<https://patients.uroweb.org/other-diseases/erectile-dysfunction/>], data dostępu 19.05.2020. 3. *Mayo Clinic ED Overview* [<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/erectile-dysfunction/symptoms-causes/syc20355776#:~:text=Flaccid%20an>]

d%20erect%20penis,The%20penis%20contains&text=During%20sexual%20arousal%2C%20nerve%20impulses,erection%20firm%20enou
 gh%20for%20sex., data dostępu 23.06.2017. 4. Depko A., Krzystanek M., Wełnicki M., Borkowski T., Skrzypulec-Plinta V., Mamcarz A.,
Skuteczna farmakoterapia zaburzeń erekcji. Czy tadalafil powinien być lekiem dostępnym bez recepty? Opinia ekspercka, 2020; 8 5. Althof SE,
 Cappelleri JC, Shpilsky A, Stecher V, Diuguid C, Sweeney M, et al. *Treatment responsiveness of the Self-Esteem And Relationship
 questionnaire in erectile dysfunction.* Urology. 2003;61(5):888-92. 6. Fisher WA, Rosen RC, Eardley I, Niederberger C, Nadel A, Sand M. *The
 multinational men's attitudes to life events and sexuality (males) study: I. prevalence of erectile dysfunction and related health concerns in the
 general population. Current medical research and opinion.* 2004;20(5):607-17. 7. *NHS_10 stress busters* [https://www.nhs.uk/mental-
 health/self-help/guides-tools-and-activities/tips-to-reduce-stress/], data dostępu 17.05.2020. 8. *CO-OP PHARMACY ERECTILE
 DYSFUNCTION PR SURVEY* [https://www.atomikresearch.co.uk/case-studies-archive/co-op-pharmacy-erectile-dysfunction-pr-survey/],
 data dostępu 27.04.2020. 9. *NHS - Obesity* [https://www.nhs.uk/conditions/obesity/], data dostępu 14.05.2020. 10. Tostes RC, Carneiro
 FS, Lee AJ, Giachini FR, Leite R, Osawa Y, et al. *Cigarette smoking and erectile dysfunction: focus on NO bioavailability and ROS generation.*
The journal of sexual medicine. 2008;5(6):1284-95. 11. Santtila P, Sandhabba NK, Jern P, Varjonen M, Witting K, Von Der Pahlen B.
Recreational use of erectile dysfunction medication may decrease confidence in ability to gain and hold erections in young males. International
 journal of impotence research. 2007 Nov;19(6):591-6. 12. Bang-Ping Jiann, *Erectile Dysfunction Associated with Psychoactive Substances,*
Chonnam Med J 2008 13. Jannini EA, Lenzi A, Isidori A, Fabbri A. COMMENTARY: *Subclinical erectile dysfunction: Proposal for a novel
 taxonomic category in sexual medicine.* The Journal of Sexual Medicine. 2006 Sep 1;3(5):787-94 14. *NHS_Erectile dysfunction_impotence*
 [https://www.nhs.uk/conditions/erection-problems-erectile-dysfunction/], data dostępu 14.05.2020.

Galeria

