

VICKS ANTIGRIP MAX 14 saszetek

Cena: 23,80 PLN



Opis słownikowy

Dawka	(1g+0,016g+4mg)/sasz.
Opakowanie	14 sasz.
Postać	gran.do sporz.roztw.doust.
Producent	WICK PHARMA ZWEIGNIEDERLASSUNG DER PROCTER & GAMBLE GMBH
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum, Chlorphenamini maleas

Opis produktu

WskazaniaVICKS ANTIGRIP MAX 14 saszetek Leczenie objawowe przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką, słabym lub umiarkowanym bólem (np. bólem głowy, gardła, mięśni), obrzękiem błony śluzowej nosa z tworzeniem wydzieliny. **Działanie**Vicks SymptoMed Max to lek wieloskładnikowy. Paracetamol odpowiada za działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Fenylefryna działa obkurczająco na naczynia krwionośne. Dzięki temu zmniejsza przekrwienie i opuchnięcie błony śluzowej nosa. Oddychanie staje się łatwiejsze. Chlorfenamina jest lekiem przeciwhistaminowym. Zmniejsza ilość śluzu produkowanego przez śluzówkę jam nosowych. **Sposób użycia**Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dorośli: jedna saszетка co 6-8 godzin. Nie należy stosować więcej niż 4 saszетки w ciągu doby. Zawartość jednej saszетки rozpuścić w niewielkiej ilości gorącej, lecz nie wrzącej wody (najlepiej w połowie szklanki wody). Pozostawić do ostygnięcia i uzyskania temperatury odpowiedniej do picia. Jeżeli gorączka występuje dłużej niż przez 3 dni leczenia, ból lub inne objawy dłużej niż 5 dni, objawy ulegają nasileniu lub pojawiają się nowe, należy zwrócić się do lekarza. Vicks AntiGrip Max należy stosować, gdy występują objawy bólowe i gorączka. W przypadku ich ustąpienia powinno się zakończyć stosowanie leku. **Ważne**Kiedy nie stosować leku Vicks AntiGrip Max: Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze, Jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy, Jeśli pacjent ma jakąkolwiek ciężką chorobę serca lub tętnic (taką jak choroba wieńcowa), Jeśli u pacjenta stwierdzono tachykardię (zbyt szybkie bicie serca), Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek, Jeśli pacjent ma jaskrę, Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, Jeśli pacjent leczony jest lekiem z grupy inhibitorów monoaminoooksydazy, (IMAO) (takimi jak niektóre leki przeciwdepresyjne lub leki stosowane do leczenia choroby Parkinsona) oraz w okresie 15 dni po ich odstawieniu. **Skład**Substancjami czynnymi leku są: paracetamol (Paracetamolium), fenylefryny wodorowinian (Phenylephrini hydrogenotartas) i chlorfeniramin maleinian (Chlorphenamini maleas). 1 saszетка zawiera 1000 mg paracetamolu, 15,58 mg fenylefryny wodorowiniany, 4 mg chlorfeniramin maleinianu. Substancje pomocnicze to: mannitol, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K30, aromat pomarańczowy PHS 132958.