OLMED sp. z o.o. sp. k.
ul. Jagienki 32, Łódź
42 640 50 34

XYLOMETAZOLIN APTEO MED krople do nosa 0,05% 10 ml

Cena: 7,13 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,5 mg/ml
Opakowanie	10 ml (butelka)
Postać	krop.do nosa, roztw.
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Xylometazolini hydrochloridum

Opis produktu

OpisXYLOMETAZOLIN APTEO MED krople do nosa 0,05% 10 ml Stosowany w leczeniu pomocniczym ostrego nieżytu nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego, ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa, ostrego zapalenia ucha środkowego (w celu udrożnienia trąbki słuchowej).DziałanieLeczenie pomocnicze ostrego nieżytu nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego, ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa, ostrego zapalenia ucha środkowego (w celu udrożnienia trąbki słuchowej).**Sposób użycia**Produktu Xylometazolin Apteo Med nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Stosowanie u dzieci w wieku od 2 do 11 lat powinno odbywać się pod nadzorem dorosłych.Produktu Xylometazolin Apteo Med nie należy stosować dłużej niż przez pięć kolejnych dni. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.Dzieci w wieku od 2 do 5 lat (pod nadzorem dorosłych):1 lub 2 krople roztworu Xylometazolin Apteo Med do każdego otworu nosowego 1 lub 2 razy na dobę (co 8 do 10 godzin). Nie należy stosować więcej niż 2 dawki do każdego otworu nosowego na dobę.Dzieci w wieku od 6 do 11 lat (pod nadzorem dorosłych):2 do 4 kropli roztworu Xylometazolin Apteo Med do każdego otworu nosowego 2 lub 3 razy na dobę, w razie konieczności.Nie należy stosować więcej niż 3 dawki produktu do każdego otworu nosowego na dobę.Zaleca się, aby ostatnią dawkę produktu przyjąć bezpośrednio przed snem**Ważne**Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ksylometazoliny chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nie należy stosować u pacjentów po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą przeznosową, takich jak np. przezklinowe usunięcie przysadki, i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej; jaskra z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku); wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa.**Skład**Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku, co odpowiada 0,012 – 0,016 mg ksylometazoliny chlorowodorku/kroplę roztworu (0,014 ± 15%). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór.