

## YALUGARD - syrop przeciwrefluksowy 20 sasz. po 10 ml

Cena: 39,85 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	20 sasz. po 10 ml
Postać	-
Producent	DIATHER PETRUSEWICZ SP.K.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Właściwości** Yalugard Syrop na refluks zgagę, 20 saszetek Yalugard - wyrób medyczny pod postacią syropu - wskazany w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego i refluksu krtaniowo-gardłowego oraz dolegliwości takich jak: zapalenie przełyku, zarzucanie treści pokarmowej, trudność w przełykaniu (dysfagia), ból podczas przełykania (odynofagia) oraz zgaga (pieczenie przełyku), zwiększa pH żołądka i chroni błonę śluzową przed skutkiem refluksu. Dodatkowo produkt wspomaga procesy regeneracji błony śluzowej żołądka i przełyku. Tworzy mechaniczną barierę antyrefluksową Zapobiega cofaniu się treści pokarmowej Zobojętnia sok żołądkowy i hamuje aktywność pepsyny Przyspiesza proces opróżniania żołądka Regeneruje podrażnioną śluzówkę przełyku i zapewnia jej ochronę Wyrób medyczny Yalugard dedykowany jest: pacjentom przyjmującym leki z grupy: azotany, blokery kanałów wapniowych, teofilina, alfa-blokery, sterydy, beta2 mimetyki osobom starszym pacjentom otyłym/z cukrzycą – nadmierna masa ciała może zwiększać ciśnienie w jamie brzusznej i sprzyjać refluksowi. pacjentom palącym – palenie papierosów osłabia zwieracz dolny przełyku. kobietom w ciąży – refluks często występuje w ciąży (wzrost ciśnienia w jamie brzusznej – powiększająca się macica) pacjentom z nieprawidłową dietą – spożywanie tłustych, pikantnych, słodkich potraw może zaostrzać objawy. pacjentom nadużywającym alkoholu – alkohol spożywany w większych ilościach obniża napięcie dolnego zwieracza przełyku. Dodatkowo silnie pobudza produkcję kwasu żołądkowego. **Sposób użycia** Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, jedna saszetka po każdym głównym posiłku oraz wieczorem przed snem. Przed użyciem wstrząsnąć zawartość saszetki lekko ściskając jej boki, następnie otworzyć i zażyć. Nie zaleca się stosować dłużej niż 30 dni. Jeżeli objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem. **Ważne** CE 1370 **Składniki** Alginian sodu, wodorowęglan sodu, węglan wapnia, suchy ekstrakt z nasion tamarindowca (Tamarindus indica L.) standaryzowany na zawartość polisacharydów, kwas hialuronowy (hialuronian sodu), guma ksantanowa, naturalne aromaty, p-hydroksybenzoesan sodowy propylu, p-hydroksybenzoesan sodowy metylu, poloxamer 407, sukraloza, woda Skład w momencie publikacji. Aktualne INCI znajduje się na stronie producenta i/lub opakowaniu.